PLANILLA DE INFUSIÓN DE HIERRO SACARATO

DATOS DEL PACIENTE

Nombre y apellido: _____

DNI: _____ Diagnóstico: _____

INDICACIONES DE ADMINISTRACIÓN

1. Acceso venoso

Colocar acceso periférico, verificar retorno y permeabilizar con solución fisiológica al 0,9 %.

2. Premedicación en primera infusión (según prescripción médica)

Difenhidramina (Benadryl): 1 mL en 20 mL de SF, a pasar en 15 minutos.

Hidrocortisona 100 mg IV en bolo o dexametasona 8 mg IV (1 ampolla).

3. Administración de hierro sacarato

En caso de primera infusión: 100 mg de hierro sacarato diluidos en 100 mL de SF al 0,9 %, a pasar lento.

Iniciar a baja velocidad, con control de signos vitales.

Registrar cada infusión y su tolerancia en la tabla inferior.

CONTROL CLÍNICO Signos vitales antes, durante y después de la infusión.

Suspender la infusión si se sospecha reacción adversa y evaluar clínicamente.

REGISTRO DE INFUSIONES

Dosis y dilución	Tiempo de infusión	Fecha / hora	SV / tolerancia	Firma y sello
1. 300 mg de hierro sacarato en 300 mL de SF 0,9 %	90 minutos			
2. 300 mg de hierro sacarato en 300 mL de SF 0,9 %	90 minutos			
3. 300 mg de hierro sacarato en 300 mL de SF 0,9 %	90 minutos			

Frecuencia de administración: ☐ Semanal ☐ Bisemanal

RESUMEN DEL TRATAMIENTO

Cantidad total de hierro a administrar: _____ **mg**

Número total de ampollas a administrar: _____ **amp.**

Médico tratante: _____ Fecha: _____

Firma y sello: _____